

# AUSSAATEMPFEHLUNG FÜR PASTINAKEN-SAATGUT

Zur Erzielung eines optimalen Keimergebnisses und einer optimalen Entwicklung der Keimpflanzen von Pastinaken-Saatgut geben wir folgende Empfehlungen:

- ▶ Verwenden Sie das Pastinaken-Saatgut so bald wie möglich nach der Lieferung und innerhalb des auf der Packung angegebenen Datums der Mindestverwendbarkeit.
- ▶ Lagern Sie das Pastinaken-Saatgut in der geschlossenen Originalpackung zwischen 5 und 15°C. Versuchen Sie, die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit konstant zu halten. Das Pastinaken-Saatgut sollte nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden oder in der Nähe von Wärmequellen gelagert werden.
- ▶ Säen Sie das Pastinaken-Saatgut, wenn der Boden ausreichend feucht ist.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass der Boden nach der Aussaat ausreichend feucht ist, um einen guten Aufgang und eine erfolgreiche Pflanzenentwicklung sicherzustellen.
- ▶ Die optimale Temperatur für die Keimung liegt zwischen 15 und 20°C. Pastinaken können unterhalb und oberhalb dieser Temperaturspanne keimen, aber die Entwicklung und die Uniformität können beeinträchtigt werden.

Die oben angegebenen Empfehlungen basieren auf unseren Informationen und Erfahrungen. Die Keimung und Jungpflanzenentwicklung kann durch jahreszeitliche und klimatische Gegebenheiten während des Anbaues und der Pflanzenentwicklung beeinflusst werden.

Der Schutz dieses Saatgutes erfolgte entsprechend dem abgestimmten Qualitätsstandard. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der der Umwelt sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

## Allgemein

- ▶ Behandeltes Saatgut darf nicht verzehrt, verarbeitet oder verfüttert werden.
- ▶ Es ist von Kindern, Nutz- und Wildtieren fernzuhalten. Saatgutsäcke müssen vorsichtig gehandhabt werden.
- ▶ Kontakt über Haut und Atemwege ist zu vermeiden. Während der Handhabung des Saatgutes und der Gerätereinigung ist geeignete Schutzkleidung zu tragen.
- ▶ Hände und nackte Hautstellen sind vor dem Essen und nach der Arbeit zu waschen.
- ▶ Verschüttetes Saatgut ist zu Entfernen.
- ▶ Behandeltes Saatgut ist von Oberflächenwasser fernzuhalten.

## Vor der Saat

- ▶ Beim Öffnen der Saatgutsäcke und Füllen der Sämaschine ist die Entwicklung von Staub zu vermeiden.
- ▶ Staub vom Boden der Saatgutsäcke darf nicht in die Sämaschine gefüllt werden.
- ▶ Behandeltes Saatgut darf nicht mit zusätzlichen Produkten behandelt werden.

## Bei der Saat

- ▶ Bei Verwendung einer pneumatischen Sämaschine ist der Staub des behandelten Saatgutes mit Hilfe von Deflektoren zum Boden hin bzw. in den Boden zu leiten.
- ▶ Beim Säen ist die empfohlene Saatkichte einzuhalten.
- ▶ Zum Schutz von Vögeln und Säugetieren ist das Saatgut mit Erde abzudecken, auch am Ende der Reihe.

## Nach der Saat

- ▶ Leere Säcke oder übrig gebliebenes behandeltes Saatgut darf nicht in der Umwelt verbleiben sondern ist entsprechend lokaler Vorgaben zu entsorgen.
- ▶ Es ist sicherzustellen, dass übrig gebliebenes Saatgut in die Originalsäcke zurückgegeben wird und leere Tüten nicht für andere Zwecke benutzt werden.

# PASTINAKEN- UND SELLERIEAUSSCHLAG

Pastinaken- und Sellerieausschlag, auch Phytophotodermatitis (PPD) genannt, ist eine Hauterkrankung, die durch den Kontakt mit einigen Pflanzen verursacht wird, darunter Pastinaken und wilde Pastinake (oder Riesenbärenklau), von dem die Krankheit ihren Namen hat.

Pastinaken und Sellerie enthalten Stoffe, die bei manchen Menschen Hautreizungen hervorrufen können und die Haut sehr empfindlich gegenüber Sonnenlicht machen. Dies kann zu starken Verbrennungen führen.

## SYMPTOME

- ▶ Ausschlag
- ▶ Blasenbildung auf der Haut
- ▶ Hautverfärbung (dunkelrot, violett oder braun)

## BEHANDLUNG

Der Ausschlag heilt in der Regel ohne Behandlung ab, wenn Sie den Kontakt mit der Pflanze, die ihn verursacht hat, vermeiden.

Zu den Behandlungsmöglichkeiten gehören:

- ▶ Waschen Sie die betroffene Stelle und bedecken Sie den Ausschlag mit einem kühlem, feuchtem Tuch oder Verband, um die Schwellung zu verringern.
- ▶ Cortisonsalben können sparsam verwendet werden (fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker), wenn der Ausschlag sehr stark ist.
- ▶ Schützen Sie die betroffene Stelle vor Sonnenlicht mit Kleidung, Handschuhen und Schuhwerk.

▶ [bejosamen.de](http://bejosamen.de)

## PRÄVENTION

Vermeiden Sie Hautkontakt mit Pflanzen, die einen Pastinakenausschlag verursachen können, durch die Nutzung von Schutzausrüstung (PSA).

Wenn Sie mit Pflanzen in Kontakt kommen, die einen Pastinakenausschlag verursachen können, waschen Sie die und bedecken Sie die Haut sofort, um den Kontakt mit Sonnenlicht zu vermeiden.

Wenn Sie Pastinaken oder andere Pflanzen ausreißen müssen, die die Probleme verursachen können, tragen Sie Handschuhe und ein langärmeliges Hemd.



## Schnelle Fakten:

- ▶ Pastinaken- und Sellerieausschlag, auch genannt Phytophotodermatitis, ist eine Hauterkrankung, die durch den Kontakt mit bestimmten Pflanzen verursacht wird.
- ▶ Pastinaken- und Sellerieausschlag kann zu schmerzhafter Blasenbildung und Hautverfärbung führen.
- ▶ Wenn Sie mit Pflanzen in Kontakt kommen, die Pastinaken- und Sellerieausschlag verursachen können, waschen Sie die Stelle und bedecken Sie die Haut sofort.